

Helsingør Kommune

Tal for 2021

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.700 personer i kommunen)	5	6	7	5	11	4	4
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (7.600 personer i kommunen)	18	16	14	18	16	16	16
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (9.800 personer i kommunen)	16	19	18	19	18	16	24
Ensomhed # (5.300 personer i kommunen)	13	11	11	12	20	11	6
Høj score på stressskala # (14.000 personer i kommunen)	30	29	28	31	40	27	26
Daglig rygning # (6.900 personer i kommunen)	13	14	16	13	16	16	10
E-cigaretter # (1.500 personer i kommunen)	3	3	4	2	5	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.600 personer i kommunen)	3	3	5	1	11	1	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.700 personer i kommunen)	7	10	14	7	11	7	14
Rusdrikker ugentligt # (6.400 personer i kommunen)	12	13	20	8	18	14	10
Usundt kostmønster # (7.100 personer i kommunen)	14	15	19	11	25	13	12
Lav fysisk aktivitet # (8.500 personer i kommunen)	18	18	19	17	23	14	20
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (23.000 personer i kommunen)	62	52	55	50	64	60	29
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (14.900 personer i kommunen)	35	35	38	31	49	24	40
Inaktiv transport ** ## (10.100 personer i kommunen)	27	38	37	38	26	43	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (15.700 personer i kommunen)	32	34	40	28	21	38	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.700 personer i kommunen)	15	17	19	14	14	20	14
Meget generet af søvnproblemer # (7.100 personer i kommunen)	14	15	12	17	20	14	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Helsingør Kommune

Tal for 2021

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.500 personer i kommunen)	5,3	6,6	7,8	5,5	0,9	5,5	12,7
Hjertesygdom ** (2.500 personer i kommunen)	3,6	4,7	5,9	3,7	0,2	2,4	11,9
Apopleksi *** (1.200 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,5	2,1	0,1	1,1	5,8
Kræft *** (2.600 personer i kommunen)	3,7	4,9	4,4	5,3	0,3	3,1	11,3
KOL * (3.400 personer i kommunen)	4,7	6,4	5,9	6,9	=	4,9	13,7
Astma ** (3.700 personer i kommunen)	6,1	7,1	6,0	8,2	5,4	6,9	8,8
Allergi – selvrapporteret ## (15.000 personer i kommunen)	31,3	30,9	25,3	36,1	35,3	30,6	28,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.000 personer i kommunen)	1,7	1,9	1,8	2,0	0,6	1,7	3,1
Slidgigt – selvrapporteret # (13.400 personer i kommunen)	19,2	27,7	21,8	32,9	4,1	23,6	51,5
Ryggsygdom – selvrapporteret # (7.900 personer i kommunen)	12,7	16,4	15,7	17,0	3,2	18,3	23,2
Knogleskørhed ** (1.800 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,1	5,4	=	1,3	9,2
Kroniske smerter – selvrapporteret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (9.100 personer i kommunen)	16,8	18,9	12,0	25,2	31,3	18,9	9,5
Depression ** (3.600 personer i kommunen)	6,4	6,9	5,2	8,5	4,0	7,0	9,1
Angst ** (1.900 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,8	4,5	4,8	4,0	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	3,4	3,5	3,1	3,8			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Helsingør Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.400 personer i kommunen)	5	5	5	5	3	6	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (9.000 personer i kommunen)	15	17	15	19	11	16	25
Ensomhed ## (3.800 personer i kommunen)	8	7	7	8	11	6	7
Høj score på stressskala # (13.100 personer i kommunen)	25	27	21	32	42	23	23
Daglig rygning # (9.900 personer i kommunen)	16	20	21	19	27	21	13
E-cigaretter ## (1.700 personer i kommunen)	3	3	4	3	4	4	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.600 personer i kommunen)	8	7	8	6	8	5	12
Rusdrikker ugentligt # (5.100 personer i kommunen)	14	10	14	7	18	10	6
Usundt kostmønster # (6.300 personer i kommunen)	12	13	16	9	18	11	12
Lav fysisk aktivitet ## (10.800 personer i kommunen)	19	22	24	20	32	16	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (26.900 personer i kommunen)	64	58	63	53	68	63	42
Skærmtid – 4 timer eller mere # (14.500 personer i kommunen)	31	32	35	28	41	22	44
Inaktiv transport ** ## (9.000 personer i kommunen)	20	31	32	30	23	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (17.200 personer i kommunen)	31	35	41	29	23	39	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (8.500 personer i kommunen)	13	17	19	15	12	19	17
Meget generet af søvnproblemer # (6.900 personer i kommunen)	13	14	11	16	14	15	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Helsingør Kommune

Tal for 2017

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.000 personer i kommunen)	5,1	5,9	6,9	4,9	0,7	4,5	12,5
Hjertesygdom ** (2.700 personer i kommunen)	4,1	5,3	6,4	4,3	0,2	3,0	13,6
Apopleksi *** (1.100 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,5	1,9	=	1,2	5,7
Kræft *** (2.200 personer i kommunen)	3,4	4,3	4,1	4,5	0,2	2,8	10,5
KOL * (3.500 personer i kommunen)	4,6	6,9	6,3	7,4	=	5,8	14,5
Astma ** (3.500 personer i kommunen)	6,0	6,9	5,6	8,0	4,9	6,5	9,0
Allergi – selvrapporteret ## (13.900 personer i kommunen)	29,2	28,4	24,9	31,7	29,8	31,5	21,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,6	1,5	1,3	1,7	0,5	1,5	2,5
Slidgigt – selvrapporteret # (12.400 personer i kommunen)	18,0	25,0	19,3	30,3	5,5	20,8	46,1
Ryggsygdom – selvrapporteret # (8.000 personer i kommunen)	11,6	16,1	15,0	17,1	4,7	19,3	18,2
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,7	2,9	1,0	4,7	=	1,2	8,3
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (9.000 personer i kommunen)	16,0	18,5	14,8	22,2	18,9	23,6	9,3
Depression ** (4.200 personer i kommunen)	7,1	8,2	6,0	10,4	4,2	8,7	10,8
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	3,0	3,0	2,2	3,8	3,5	3,4	2,1
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	3,6	3,2	2,8	3,5			3,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Helsingør Kommune

Tal for 2013

		Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
		Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
	Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (8.400 personer i kommunen)	13	17	14	20	3	17	27
	Høj score på stressskala # (9.900 personer i kommunen)	21	22	17	26	21	22	22
	Daglig rygning # (8.200 personer i kommunen)	15	17	20	14	15	18	14
	Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.800 personer i kommunen)	10	8	11	5	7	8	8
	Rusdrikker ugentligt # (4.700 personer i kommunen)	15	10	16	5	15	10	6
	Usundt kostmønster # (5.000 personer i kommunen)	10	11	15	7	13	10	11
	Lav fysisk aktivitet # (8.800 personer i kommunen)	15	18	17	20	18	15	26
	Inaktiv transport ** ## (8.600 personer i kommunen)	22	30	32	29	18	37	
	Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (16.100 personer i kommunen)	30	33	41	27	19	38	34
	Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.700 personer i kommunen)	11	12	13	11	7	12	15
	Meget generet af søvnproblemer # (5.700 personer i kommunen)	11	12	10	13	6	13	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Helsingør Kommune

Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.800 personer i kommunen)	4,9	5,6	6,6	4,7	0,7	4,4	12,3
Hjertesygdom ** (2.500 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,9	4,2	0,2	2,8	13,7
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,2	1,8	0,1	1,1	5,4
Kræft *** (2.000 personer i kommunen)	3,2	4,1	3,9	4,3	0,3	2,7	10,0
KOL * (3.100 personer i kommunen)	4,3	6,2	5,7	6,7	=	5,5	12,8
Astma ** (3.400 personer i kommunen)	6,0	6,8	5,6	8,0	5,1	6,4	9,0
Allergi – selvrapporteret ## (13.200 personer i kommunen)	27,5	28,0	25,0	30,7	25,7	30,7	24,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,4	1,3	1,1	1,4	0,4	1,2	2,1
Slidgigt – selvrapporteret # (11.300 personer i kommunen)	17,6	23,8	19,0	27,9	1,1	23,1	41,7
Ryggsygdom – selvrapporteret # (7.000 personer i kommunen)	12,2	15,0	14,7	15,2	3,4	16,7	19,5
Knogleskørhed ** (1.200 personer i kommunen)	2,6	2,4	0,8	3,9	=	1,1	6,9
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (6.600 personer i kommunen)	13,5	14,1	8,7	18,7	14,6	17,1	7,2
Depression ** (4.700 personer i kommunen)	8,1	9,5	6,7	12,1	5,3	9,9	12,2
Angst ** (1.400 personer i kommunen)	2,7	2,7	1,9	3,5	3,1	3,0	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,7	2,8	2,7	2,8			2,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Helsingør Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (8.200 personer i kommunen)	14	17	20	15	9	15	28
Høj score på stressskala ## (10.200 personer i kommunen)	22	23	22	24	25	22	24
Daglig rygning # (10.500 personer i kommunen)	19	22	22	22	19	24	19
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.000 personer i kommunen)	13	13	16	10	14	11	17
Usundt kostmønster # (4.700 personer i kommunen)	10	10	14	7	15	8	12
Lav fysisk aktivitet # (6.600 personer i kommunen)	14	14	15	13	17	11	20
Inaktiv transport ** ## (8.800 personer i kommunen)	24	30	37	24	17	36	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (16.400 personer i kommunen)	30	35	45	26	22	37	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.500 personer i kommunen)	11	12	12	11	9	12	13
Meget generet af søvnproblemer # (5.700 personer i kommunen)	11	12	11	13	12	11	15

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Helsingør Kommune

Tal for 2010

	Region Hoved- staden	Helsingør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.400 personer i kommunen)	4,2	4,8	5,7	4,1	0,7	3,9	11,0
Hjertesygdom ** (2.500 personer i kommunen)	4,3	5,1	5,8	4,4	0,2	2,6	15,4
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,1	1,8	=	1,1	5,8
Kræft *** (1.700 personer i kommunen)	2,9	3,5	3,2	3,8	0,5	2,4	8,9
KOL * (2.700 personer i kommunen)	3,9	5,5	4,9	6,0	=	5,1	11,4
Astma ** (3.300 personer i kommunen)	6,0	6,7	5,5	7,8	5,4	6,3	9,0
Allergi – selvrapporteret ## (11.100 personer i kommunen)	26,7	24,7	19,3	29,6	24,8	25,8	21,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,3	1,0	0,9	1,2	0,3	1,0	1,8
Slidgigt – selvrapporteret # (10.300 personer i kommunen)	17,7	22,2	19,5	24,5	1,6	20,4	41,9
Rygssygdom – selvrapporteret # (7.700 personer i kommunen)	12,5	16,7	17,5	16,1	6,4	18,8	19,7
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,2	1,7	0,5	2,9	=	0,9	5,4
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (7.500 personer i kommunen)	15,6	16,5	8,9	23,4	20,8	18,0	9,5
Depression ** (4.200 personer i kommunen)	7,7	8,6	5,9	11,2	4,2	8,8	12,3
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	2,4	2,7	1,7	3,6	3,2	2,8	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	4,0	3,0	2,5	3,3			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.